

Varianta 077

Subiectul I

- a) $|AB| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. $|AC| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$.
- b) $\vec{AB} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$. $\vec{AC} = 3\vec{i} - 4\vec{j} \Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4 \cdot 3 + 3 \cdot (-4) = 0$.
- c) Din b) $\Rightarrow m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$.
- d) Fie C' simetricul lui C fata de $B \Rightarrow x_{C'} = 2x_B - x_C = 7$. $y_{C'} = 2y_B - y_C = 11 \Rightarrow C'(7, 11)$.
- e) $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{4}$.
- f) $|z| = \left| \frac{3-4i}{-4+3i} \right| = 1$

Subiectul II

1. a) $\lg 1000 = 3$. b) din $a_4 = 17$ si $a_3 = 12 \Rightarrow r = 5$ si $a_3 = a_1 + 2r \Rightarrow a_1 = 2$. c) Se demonstrează prin calcul.
- d) Coef $x^3 = 2 \cdot C_4^3 = 8$. e) $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
2. a) $f'(x) + \frac{1}{x^2} = 1, \forall x > 0$. b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 1 - 1 = 0$.
- c) $\int_1^2 f''(x) \Big|_1^2 = f'(2) - f'(1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. d) $A(2, a) \in G_f \Leftrightarrow f(2) = a \Rightarrow a = \frac{5}{2}$.
- e) $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + x = f(x), \forall x > 0$.

Subiectul III

a) $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & y-x & z-x \\ 0 & y^2-yx & z^2-xz \end{vmatrix} = (y-x)(z-x)(z-y)$.

b) Inmulțim fiecare linie L_i cu $(-a)$ și adunăm rezultatul la linia L_{i+1} pentru $i = 3, 2$ respectiv 1 și obținem un determinant din care dăm factori comuni $(b-a)(c-a)(d-a)$ și după dezvoltarea sa după primul element găsim un determinant de tipul Δ_1 (din pct.a). $\Rightarrow \Delta$ egal cu produsul căutat.

c) $f'(x) = (x-b)(x-c)(x-d) + (x-a)(x-c)(x-d) + (x-a)(x-b)(x-d) + (x-a)(x-b)(x-c)$.

d) din (c) $\Rightarrow f'(a) = (a-b)(a-c)(a-d)$.

e) $A = \Delta + \Delta'$, unde Δ' are ultima linie egală cu o combinație liniară ale celorlalte linii ale sale

$(L_4 = 2L_3 + 3L_2 + 4L_1) \Rightarrow \Delta' = 0 \Rightarrow A = \Delta$

f) Dezvoltăm A după ultima linie

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{-g(a) \cdot \Delta}{(d-a)(c-a)(b-a)} + \frac{g(b) \cdot \Delta}{(b-a)(c-b)(d-b)} + \frac{-g(c) \cdot \Delta}{(c-a)(d-c)(c-b)} + \frac{g(d) \cdot \Delta}{(d-a)(d-b)(d-c)} \stackrel{(d)}{=} \\ &= \Delta \cdot \left(\frac{g(a)}{f'(a)} + \frac{g(b)}{f'(b)} + \frac{g(c)}{f'(c)} + \frac{g(d)}{f'(d)} \right) \stackrel{(e)}{\Rightarrow} \text{Suma căutată} = 1. \end{aligned}$$

g) Deoarece ultima linie a lui A este o combinație liniară ale primelor două linii ($L_4 = -2L_2 - L_1$)
 $\Rightarrow A = 0$. Dezvoltând A după ultima linie și folosind $A = 0 \Rightarrow \frac{h(a)}{f'(a)} + \frac{h(b)}{f'(b)} + \frac{h(c)}{f'(c)} + \frac{h(d)}{f'(d)} = 0$

Subiectul IV

a) $f''(x) = e^x - 1 - \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!}$. $f'''(x) = e^x - 1 - \frac{x}{1!}$. $f^{(4)}(x) = e^x - 1$.

b) $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = f^{(4)}(0) = 0$.

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{5x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{20x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{60x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(4)}(x)}{120x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{120} = \frac{1}{120}$.

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0 \in \mathbf{R} \Rightarrow y = 0$ asimptotă orizontală la G_g la $+\infty$

e) Pentru $\begin{cases} x < 0 \Rightarrow f^{(4)}(x) < 0 \\ x > 0 \Rightarrow f^{(4)}(x) > 0 \end{cases} \Rightarrow f^{(3)}$ strict crescătoare pe $(0, \infty)$ și strict descrescătoare pe

$(-\infty, 0) \Rightarrow x = 0$ este punct de minim pentru $f^{(3)} \Rightarrow f^{(3)}(x) \geq 0, \forall x \in \mathbf{R} \Rightarrow f''$ strict crescătoare pe

\mathbf{R} și din $f''(0) = 0 \Rightarrow \begin{cases} f''(x) < 0, \forall x < 0 \Rightarrow f' \text{ descrescătoare pe } (-\infty, 0) \\ f''(x) > 0, \forall x > 0 \Rightarrow f' \text{ crescătoare pe } (0, \infty) \end{cases} \Rightarrow x = 0$ punct minim

pentru f' și din $f'(0) = 0 \Rightarrow f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}$.

f) Deoarece $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}$ $f'(0) = 0 \Rightarrow f$ strict crescătoare pe \mathbf{R} . $f(0) = 0$ rezultă că $f(x) < 0, \forall x < 0$.

g) Din e) și f) $\Rightarrow f'(x) > 0, \forall x < 0 \Leftrightarrow e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}, \forall x < 0$ (a)

$$f(x) < 0, \forall x < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}, \forall x < 0$$
 (b)

Din (a), (b) $\Rightarrow 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} < e^x < 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}, \forall x < 0$ (c)

Inlocuim $-x^2$ in locul lui x in relația (c) și integrand membru cu membru obținem inegalitățile:

$$\frac{52}{70} < \int_0^1 e^{-x^2} dx < \frac{5651}{7560} \Leftrightarrow 0,74 < \int_0^1 e^{-x^2} dx < 0,75, \text{ deci aria cerută este un număr din intervalul } (0,74, 0,75).$$